

Số: /TB-TTCUDVSNC

Phước Chánh, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO
Hướng dẫn biện pháp quản lý sinh vật hại
trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2026.

Căn cứ Thông báo số 72/TB-CCTTBVTV ngày 17/7/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thông báo hướng dẫn biện pháp quản lý sinh vật gây hại trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2026;

Hiện nay, lúa vụ Hè Thu đang trong giai đoạn đứng cái – làm đòng, đối với những diện tích cấy muộn hơn so với lịch thời vụ thì đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Nhìn chung lúa sinh trưởng phát triển tốt, tuy nhiên một số diện tích bị vàng sinh lý do thiếu dinh dưỡng, dự báo trong thời gian tới một số đối tượng sinh vật gây hại có khả năng phát sinh và gây hại như: chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn,...

Để chủ động phòng trừ hiệu quả, bảo vệ sản xuất, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Chánh thông báo và hướng dẫn một số biện pháp như sau:

Về kỹ thuật chăm sóc:

- Chủ động làm cỏ sục bùn kết hợp với bón phân thúc kịp thời để giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, chú ý bón đủ và cân đối N-P-K.

- Điều tiết nước tưới phù hợp tránh chỗ thừa chỗ thiếu dẫn đến một số diện tích thiếu nước trong giai đoạn lúa làm đòng. Luôn giữ mực nước từ 3cm-4cm để đảm bảo cho lúa phát triển tốt.

- Những ruộng bị ngộ độc hữu cơ, nghẹt rễ - vàng sinh lý thì cần thay nước từ 1-2 lần, sau đó bón bổ sung thêm phân DAP (1-2kg/sào) và phun phân bón qua lá để lúa mau hồi phục.

Về dịch hại, cần chú ý phòng trừ các đối tượng sau:

1. Đối với Chuột

Hiện nay, chuột gây hại mạnh trên các trà lúa giai đoạn làm đòng ở hầu hết các cánh đồng tại các thôn, đặc biệt chuột gây hại đối với những ô ruộng kề khu vực giáp ranh gò đồi, kênh mương, rẫy keo, bờ lờ, khu đất hoang với tỷ lệ trung bình 1-2%, cao 10%. Vì vậy các thôn thường xuyên vận động nông dân tích cực diệt chuột bằng các biện pháp:

- Tăng cường diệt chuột bằng các biện pháp thủ công: bẫy kẹp, bẫy bán nguyệt.

- Phát quang bờ ruộng, kênh mương, hạn chế nơi trú ẩn.

- Không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

- Không treo, cắm các vật liệu gây ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng.

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Hiện nay, sâu cuốn lá đang ở tuổi 3-5, trưởng thành sâu cuốn lá đang ra rộ trên đồng ruộng, dự báo lúa sâu non sẽ gây hại trong

thời gian tới. Do vậy, phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-3), khi phát hiện sâu với mật độ từ 20con/m² trở lên thì tiến hành dùng một trong các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: Chlorantraniliprole + Thiamethoxam, Emamectin benzoate... (*Virtako 40WG, Angun 5 WG, Proclaim 1.9 EC, Dylan 10EC*...) để phun trừ ngay trước khi lúa trổ.

3. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Hiện nay, rầy đã xuất hiện trên đồng ruộng với mật độ thấp, tuy nhiên vào giai đoạn xung yếu của cây lúa nên hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng, vạch gốc lúa để kịp thời phát hiện rầy gây hại, phải quan sát khắp mặt ruộng để phát hiện các “ổ rầy” cục bộ. Khi phát hiện rầy có mật độ trung bình từ 2-3con/dảnh lúa (khoảng 1.000-2.000 con/m²) thì dùng các loại thuốc có hoạt chất Pymetrozine, Imidacloprid... (*Chess 50WG, Map-Jono 700 WP*...) để phun trừ. Khi phun trừ rầy cần phải khoanh vùng và phun kỹ các “ổ rầy” để diệt trừ triệt để, tránh lây lan; luôn giữ nước trong ruộng khi phun trừ rầy.

4. Đối với bệnh khô vằn: Thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện bệnh chớm phát sinh gây hại cần xử lý một trong các loại thuốc BVTV có các hoạt chất Validamycin, Hexaconazole... (*Validacin 5SL; Vanicide 5 SL, 5 WP; Validan 3SL, 5SP; Anvil 5SC*...). Khi phun cần rẽ lối đưa vòi phun vào gốc lúa, phun kỹ vào “ổ bệnh” và các dây lúa gần bờ kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ; nếu ruộng bị bệnh nặng phải xử lý thuốc 2 lần, cách nhau 5-7 ngày.

Ngoài ra, còn chú ý các đối tượng như: Bệnh đạo ôn trên các giống nhiễm, bệnh khô vằn, bọ xít đen, sâu đục thân...

5. Khuyến cáo chung về sử dụng thuốc

Để đạt hiệu quả phòng trừ cao, khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng liều lượng - nồng độ, đúng lúc, đúng cách, đặc biệt phun đúng lượng nước và liều lượng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam; thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng quy định.

Đối với diện tích lúa đang trổ phải phun thuốc vào chiều mát, tránh những lúc trời mưa để đạt hiệu quả cao. Những ruộng chưa bị sâu bệnh gây hại chỉ nên theo dõi không nên phun thuốc tràn lan gây tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường.

Trên đây là nội dung hướng dẫn quản lý sinh vật gây hại trên cây lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ vụ Hè Thu năm 2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Chánh kính đề nghị các trưởng thôn thông báo hướng dẫn cho nông dân phòng trừ hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND xã (Bc);
- Phòng Kinh tế xã (để biết);
- Trưởng thôn và Ban nhân dân thôn;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Thị Thương

